

Data publikacji: (13.07. do 19.07.2020r.)

W badanym okresie spadło **11,1** litra wody na jeden metr kwadratowy. Średnia wilgotność powietrza wahała się w przedziale **53-79%**. Średnia dobowa temperatura powietrza kształtowała się w przedziale od **14,8 do 21,5 stopni C**. Średnia temperatura powietrza, mierzona przy gruncie, zamknęła się w przedziale **16,9-22,9 stopni C**. Temperatura gruntu, mierzona na głębokości 10 cm, podobnie jak w poprzednim okresie, była stabilna i wahała się w przedziale od **17,5 do 20,7 stopni C**. W badanym okresie wiatr w naszym rejonie nie był uciążliwy i wiał słabo lub łagodnie. Wiało słabo i umiarkowanie. Średnia prędkość wiatru kształtowała się w przedziale **od 1,1 do 2,4 m/sek.(4 – 8,6 km/h)**.

W porównaniu do poprzedniego okresu, spadło prawie 3 razy więcej deszczu . Średnia temperatura powietrza mierzona na wysokości 200 cm podniosła się o około 3 stopnie C. Średnia temperatura powietrza mierzona przy gruncie wzrosła o 3 stopnie C. Temperatura gruntu podniosła się o około 1 stopień C. Średnia wilgotność powietrza zmalała o około 8%. Wiatr wiał z podobną siłą.

Roślina: (Pszemca ozima)

Stan uprawy dla miejscowości : Pięńsk

Rośliny na uprawach występują w fazach **BBCH od 83 do 87**. Rośliny znajdują się w fazie, w zależności od terminu siewu, od początku dojrzałości woskowej do dojrzałości woskowej twardej. Rośliny na plantacjach powschodziły równomiernie. Rośliny są wyrównane.

Zagrożenia:

W bieżącym okresie pojawiły się skrzypionki. Na plantacjach pszenicy ozimej występują 2 gatunki skrzypionek: skrzypionka zbożowa i skrzypionka błękitka.

Chrzążcze skrzypionek zimują w ściółce, darni lub między korzeniami. Wiosną, gdy temperatura przekracza 10°C przelatują na rośliny żywicielskie. Jaja składane są od połowy maja do połowy czerwca. Po upływie około 2 tygodni wylęgają się larwy. Szkody na plantacjach powodują zarówno chrząszcze jak i larwy (wyjadanie tkanki miękkiszowej liści). Żerowanie w sprzyjających warunkach rozpoczyna się w II dekadzie kwietnia. Rozwojowi tych szkodników sprzyja ciepła pogoda w okresie wiosny.

Zalecenia:

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania skrzypionek należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Zabiegi zwalczające przeprowadza się: w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tj. stwierdzenia 1-2 larw na 1 źdźble lub w przypadku stwierdzenia na plantacji masowego wylęgu larw (obserwujemy wówczas larwy obu gatunków). W przypadku walki chemicznej wykorzystywane mogą być preparaty zawierające w swym składzie alfa-cypermetyne, dimetoat.

Zagrożenia:

Brunatna plamistość liści zbóż

Choroba wywoływana przez *Pyrenophora tritici-repentis*. Objawy można zaobserwować w obrębie jak sama nazwa wskazuje liści a także kłosów. Na porażonych liściach powstają początkowo owalne, w późniejszym czasie brunatne plamy wielkości do 3 mm, otoczone chlorotyczną obwódką. W czasie wegetacji plamy te powiększają się. Gdy jest ich więcej, łączą się i prowadzą do zamierania liści. W centralnej części nekrozy czasami zauważalna jest mała, czarna plamka z białym punktem w środkowej części. Porażone liście szybko żółkną. Objawy choroby na kłosach w postaci owalnych, małych brązowych plam na plewach. Rozwojowi choroby sprzyjają uproszczenia w uprawie roli, zwłaszcza uprawa bezorkowa oraz pozostawianie dużej ilości resztek poźniwnych z pseudotecjami grzyba.

Próg szkodliwości:

- w fazie krzewienia 10-15 % porażonych roślin z pierwszymi objawami porażenia,
- w fazie strzelania w źdźbło 5% liści z pierwszymi objawami porażenia
- w fazie kłoszenia 5% liści z pierwszymi objawami porażenia.

Zalecenia:

W walce z brunatną plamistością w uprawach zbóż można wykorzystać środki ochrony roślin, w których substancją aktywną jest np. azoksystrobina czy cyprodynil.

Zagrożenia:

Septorioza paskowana liści pszenicy

Choroba wywoływana przez grzyb *Mycosphaerella graminicola*. Pierwsze objawy choroby na roślinach występują w fazie krzewienia, zmiany początkowo mają postać chlorotycznych, okrągłych plam z nieco jaśniejszym środkiem oraz z licznymi czarnymi punktami. Typowe plamy widoczne na wiosnę są owalne, brązowe lub brunatne. W późniejszych fazach rozwojowych są ograniczone nerwami liścia. Rozległe plamy doprowadzają do zasychania tkanek rośliny. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi choroby są: uproszczona uprawa roli oraz częsty udział zbóż w płodozmianie. Optymalna temperatura do wystąpienia infekcji to 20-25 ° C. Uwolnieniu zarodników z pseudotecjów sprzyja wysoka wilgotność powietrza (deszcz, mgła, rosa).

Próg szkodliwości:

- w fazie krzewienia 30-50% liści z pierwszymi objawami porażenia lub 1% liści z owocnikami,
- w fazie strzelania w źdźbło 10-20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami,
- w fazie kłoszenia 5-10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami.

Zalecenia:

W walce z septoriozą paskowaną liści wykorzystywane są środki ochrony roślin oparte na ekopsykonazolu, protiokonazolu, fluoksastrobinie.

Zagrożenia:

Septorioza plew pszenicy

Choroba wywołana działaniem *Phaeosphaeria nodurum*. Objawy widoczne już jesienią w obrębie siewek w postaci owalnych plam ze słabo widoczną obwódką. Na powierzchni plam pojawiają się nieregularnie rozrzucone bursztynowe lub prawie czarne piknidia grzyba. Porażone siewki mogą zamierać. W późniejszym czasie objawy występują także na liściach. Początkowo w postaci drobnych, chlorotycznych plam które z czasem powiększają się i przyjmują jasnobrunatną barwę i soczewkowaty kształt. Plamy mogą występować również na pochwach liściowych i źdźbłach. Często łączą się tworząc dużą, rozległą plamę o nieregularnym kształcie, otoczoną chlorotyczną obwódką. Na kłosie choroba powoduje fioletowe lub brunatne plamki w obrębie plew które z czasem brunatnieją. Takie objawy są też zauważalne na osadkach kłosowych i dokłosisiu. Optymalne temperatury dla rozwoju zarodników konidialnych wynoszą 20-25 °C, natomiast porażenie roślin zachodzi w temperaturach 22-24 °C i przy dużej wilgotności.

Zalecenia:

W przypadku septoriozy plew mogą zostać wykorzystane środki ochrony roślin oparte na difenokonazolu.

Wymienione, niebezpieczne dla zbóż, choroby grzybowe należy zwalczać zabiegami chemicznymi stosowanymi na ochronę kłosa – zabiegi te znane są jako zabieg T3. Zabiegi należało rozpocząć już w kwietniu i można kontynuować do końca lipca. Stosowanym substancjami czynnymi są głównie triazole.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.:

- Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
- Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
- Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
- Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
- Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
- Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji

Roślina: (Jęczmień ozimy)

Stan uprawy dla miejscowości : Pieńsk

Na badanym terenie (okolice Pieńska) rozpoczął się zbiór dojrzałego ziarna jęczmienia ozimego. Zbioru dokonuje się na plantacjach, które wysiano pod koniec sierpnia i na początku września. Na dzień dzisiejszy wykoszone jest około 80% areалу jęczmienia ozimego. Jęczmień wysiany w późniejszym terminie, ze względu na panującą w ubiegłym roku suszę, znajduje się głównie w fazie dojrzałości pełnej **BBCH 89**.

Zagrożenia:

W bieżącym okresie w uprawie jęczmienia ozimego stwierdzono objawy **Septoriozy plew** wywoływana przez inny gatunek grzyba: *Phaeosphaeria nodorum* Mogą się pojawić w każdym stadium wegetacji roślin. Pierwsze objawy występują już jesienią. Na liściach mają postać brunatnych, wydłużonych plam, często o soczewkowatym kształcie i słabo widocznym obrzeżu. Później w obrębie plam powstają nieregularnie rozrzucone drobne piknidia o barwie od bursztynowej do niemal czarnej. Z czasem choroba rozprzestrzenia się. Wiosną jej objawy występują także na pochwach liściowych, źdźbłach, a później także kłosach. Początkowo plamy są jasnobrązowe, potem ciemnieją, gdyż znajdujące się w ich obrębie tkanki roślin ulegają nekrozie. Na znekrotyzowanych obszarach plamy tworzą się piknidia.

W obrębie kłosów fioletowe lub brunatne plamy pojawiają się najpierw na brzegach plew, potem choroba przenosi się także na osadkę kłosa. W znekrotyzowanych plamach tworzą się piknidia.

Zalecenia:

Na plantacjach porażonych zaleca się przerwę w uprawach zbożowych, unikanie sąsiedztwa użytków zielonych i pól z samosiewami zbóż. Zaleca się również wysiew nasion mniej podatnych na septoriozę.

Z bieżących zabiegów należy zalecić zwalczanie chemiczne fungicydami , zawierającymi środki czynne: biksafen, chlorotanolin, fluksapyroksad i inne.

Należy pamiętać o tym, że w IOR pierwszeństwo mają metody nie chemiczne (agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne, hodowlane i inne) a gdy te okażą się niewystarczające, wówczas uzasadnione będzie zastosowanie ochrony chemicznej.

Roślina: (Rzepak ozimy)

Stan uprawy dla miejscowości : Pięńsk

W powiecie zgorzeleckim rozpoczął się zbiór nasion rzepaku ozimego. Skoszono około 15 % arealu. Na plantacjach nieskoszonych stwierdzono rośliny rzepaku wyrównane. Rośliny znajdują się w fazie rozwoju - **BBCH 87-89**. Jest to faza rozwoju w której od 70% łuszczyn jest dojrzałych, a nasiona są brązowe i twarde.

Zagrożenie:

Zgnilizna twardzikowa

Zgnilizna twardzikowa zagraża najmocniej plantacjom rzepaku uprawianym zbyt często po rzepaku. Objawy widoczne są od końca kwitnienia w postaci plam początkowo jasnoszarych, a potem ciemniejących. Zarodniki opadając w kątach liści, przerastają płatki kwiatowe, porażają liście i łodygi. Grzybnia przerasta wewnątrz łodyg niszcząc tkanki przewodzące roślin. Porażone łodygi zamierają i łamią się, a całe rośliny przedwcześnie zasychają. Suche rośliny w łanie zielonego jeszcze rzepaku obserwowane z daleka, to prawie na 100% efekt wyniszczenia roślin przez rozwój sprawcy zgnilizny twardzikowej. Zarodniki zgnilizny twardzikowej rozpoczynają atak przez ewentualne uszkodzenia i rany powodowane przez przymrozki i szkodniki. Potem mają już bardziej dogodne warunki rozwoju i przenoszone przez wiatr idealne lokum znajdują w kątach liści. Tam spadają płatki kwiatowe i stają się dla grzyba pożywką utrzymującą jednocześnie odpowiednią wilgoć. Pierwsze objawy choroby widoczne są na rozgałęzieniach łodyg i w kątach liści. Po żniwach skleroty zgnilizny twardzikowej pozostają w glebie i zachowują żywotność do ok. 7–8, nawet do 10 lat.). Zarodniki te rozprzestrzeniają się przez wiatr. Rozwojowi zgnilizny twardzikowej sprzyja szczególnie wysoka wilgotność gleby i powietrza oraz umiarkowane temperatury od 5 do 25 st. C w okresie kwitnienia rzepaku. Pierwszy etap infekcji ma często charakter utajony, a charakterystyczne objawy widoczne są dopiero, kiedy grzybnia przerośnie wewnątrz łodyg. Objawów zgnilizny twardzikowej trzeba szukać na łodygach, w łodygach, na łuszczynach, no i oczywiście na liściach, zwłaszcza kątowych. Liście zaatakowane przez zgniliznę twardzikową po prostu zamierają do góry od miejsca, w którym grzyb się umiejscowił. W przypadku zgnilizny, występuje też obfity nalot grzybni, a przy wertyciliozie na liściach tego nie ma. Atak zgnilizny twardzikowej związany jest z wilgotnością panującą w czasie opadania płatków

Próg szkodliwości:

Sprawcę zgnilizny twardzikowej zwalcza się od momentu pąkowania do początku opadania płatków kwiatowych. Pierwsze oznaki choroby są ostatecznym wskazaniem do zabiegu, tj. próg szkodliwości stanowi 1% roślin z objawami choroby lub 1–5 apotecjów na 1 m².

Zalecenia:

W rejonach intensywnej uprawy rzepaku i występowania w latach poprzednich tej choroby oraz uprawy odmiany podatnej na porażenie przez sprawcę zgnilizny twardzikowej wskazane jest wykonanie zabiegu profilaktycznego zawierającego jedna z substancji aktywnych azoksystrobina, tebukonazol, izopirazam, procchloraz, tiofanat metylowy

Zagrożenie:

Czerń krzyżowych

W badanym okresie objawy chorobowe mogą wystąpić na łuszczynach. Sprzyjać temu mogą warunki pogodowe: wysoka wilgotność powietrza i jego temperatura kształtująca się na poziomie 20 stopni C. Choroba rozwinie się szczególnie na plantacjach, na których zaniechano, mimo pierwszych objawów chorobowych, oprysku chemicznego fungicydami w fazie rozwoju rośliny od pełnego kwitnienia do końca kwitnienia –BBCH 65-69. W badanym okresie choroba objawia się porażonym łuszczynami, na których pojawiają się owalne lub podłużne, czarne lub brunatne, zagłębione plamy. Porażone łuszczyny zamierają lub przedwcześnie dojrzewają, pękając i osypując nasiona

Zalecenia:

Wykonanie zabiegu profilaktycznego zawierającego jedną z substancji aktywnych azoksystrobina, tebukonazol, izopirazam, procchloraz, tiofanat metylowy


Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.:

- Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
- Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
- Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
- Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
- Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
- Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

OP1-opady deszczu w mm/ metr kwadratowy



U200sr-średnia dobowa wilgotność powietrza

