

Data publikacji: (01.09. do 13.09.2020r..)

W badanym okresie (dwa tygodnie) spadło **7,4 mm** wody na jeden metr kwadratowy. Średnia wilgotność powietrza wahała się w przedziale **64-89%**. Średnia dobową temperatura powietrza kształtowała się w przedziale od **12,4 do 18,8 stopni C**. Średnia temperatura powietrza, mierzona przy gruncie, zamknęła się w przedziale **14,3-18,0 stopni C**. Temperatura gruntu, mierzona na głębokości 10 cm, podobnie jak w poprzednim okresie, była stabilna i wahała się w przedziale od **16,6 do 17,9 stopni C**. W badanym okresie wiatr w naszym rejonie nie był uciążliwy i wiał słabo lub łagodnie. Średnia prędkość wiatru kształtowała się w przedziale **od 1,2 do 2,7 m/sek.(4,3– 9,7 km/h.)**

Roślina: (Rzepak ozimy)

Stan uprawy dla miejscowości : Pieńsk

Rośliny na plantacjach rzepaku ozimego znajdują się w **fazie rozwojowej 2 do 3 liścia. BBCH 12-13**

Zagrożenie:

Zagrożeniem dla plantacji jest susza glebowa. W badanym okresie ostatnich dwóch tygodni, spadło 7,4 mm wody. Susza glebowa, szczególnie w wierzchniej warstwie gleby, może spowodować niewłaściwy transport i pobór składników pokarmowych pobieranych przez młode rośliny.

W przypadku złego następstwa roślin i wysiewie rzepaku po sobie, należy się liczyć ze wzmożonym nasileniem objawów chorobowych w przyszłym sezonie wegetacyjnym. Plantacje szczególnie narażone będą na kiłę kapusty, czerń krzyżowych, zgniliznę twardzikową czy mączniaki.

Zalecenia:

Jesienne nawożenie powinno zapewnić optymalny wzrost roślin i przygotowanie plantacji do prawidłowego przezimowania. Zaleca się w okresie nawożenia rzepaku, stosowanie specjalistycznych nawozów, dedykowanych dla tych roślin. Ważne jest, aby nawozy te zawierały w swoim składzie bor, molibden i mangan. Mikroelementy te odpowiadają za kondycję roślin jesienią i ich prawidłowe odżywianie, przez ułatwienie transpiracji wody i składników odżywczych

Roślina: (Kukurydza)

Stan uprawy dla miejscowości: Pieńsk

Rośliny na plantacjach kukurydzy znajdują się w fazie **BBCH 83-85**. Wiechy są w pełni ukształtowane. Kolby rozwijają się. Ziarniaki w kolbach znajdują się w fazie początku dojrzałości woskowej. Ziarniaki zawierają około 45 – 55 % suchej masy. Rośliny są bardzo dobrze wykształcone, łan jest wyrównany. Liście charakteryzują się odpowiednim turgorem i ukształtowaniem. Nie stwierdzono objawów chorobowych na roślinach.

Zagrożenie:

W obecnych warunkach pogodowych – wysoka temperatura powietrza 21 – 28 stopni C i niska wilgotność gleby – mogą pojawić się na roślinach objawy **chorobowe głowni pyłacej**. Porażone rośliny charakteryzują się wolniejszym wzrostem, są niższe i mają jaśniejszą barwę. Wiecha przekształca się w masę grzybni i teliospor, a kolby wykształcają mało znamion. .

Zalecenia:

Jedynym skutecznym sposobem zapobiegania tej chorobie grzybowej jest zaprawianie nasion. W sezonie wegetacji należy kontrolować uprawę pod względem rozwoju teliospor (zarodniki przetrwalnikowe), które tworzą skupienia na wiechach kukurydzy.


Zagrożenie:

Na zewnętrznych pasach uprawy kukurydzy stwierdzono **dorośle osobniki skrzypionki zbożowej**. Obecność skrzypionki na liściach kukurydzy tłumaczy się sąsiadującą bezpośrednio uprawą pszenicy ozimej. Skrzypionki odżywiają się miąższem liści, uszkadzając je wzdłuż nerwów liściowych. Owady w tej fazie rozwojowej nie powodują strat gospodarczych. Biorąc pod uwagę to, że nakłuwają liście, stają się wektorami chorób wirusowych. Należy wiedzieć, że osobniki dorosłe zimują w glebie, bezpośrednio pod jej powierzchnią. W kolejnym sezonie formy larwalne skrzypionki, znacznie poważniej uszkadzają zarówno młode rośliny kukurydzy jak i zbóż, powodując straty w plonowaniu roślin.

Zalecenia:

W celu zwalczania owadów dorosłych, zaleca się dokładne przykrywanie resztek poźniwnych po zbożach i kukurydzy. Przy silnej inwazji tych owadów, zaleca się również orkę głęboką. Układając płodozmian należy unikać następstwa po sobie roślin zbożowych.

OP1-średnia dobowa ilość opadów w mm/metr kwadratowy



U200sr-średnia dobowa wilgotność powietrza

